



INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA DLA PACJENTÓW PO LECZENIU

STRONTEM 89

Zakład Medycyny Nuklearnej
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ

PR13_P03_Z02

Instrukcja postępowania dla pacjentów po leczeniu strontem 89

Zasady ogólne:

1. Stront jest radioizotopem stosowanym w iniekcji dożylniej w celu złagodzenia bólów kostnych, przy zmianach ogniskowych w kościach w przebiegu choroby nowotworowej.
2. Pacjent po otrzymaniu strontu nie stanowi szczególnego zagrożenia dla otoczenia pod warunkiem przestrzegania poniższych zasad.
3. Podawanie Strontu jest przeciwwskazane chorym w ciąży i karmiącym matkom.
4. Leczenie innych chorób współistniejących, odbywa się według ogólnych zasad przyjętych w tego typu schorzeniach.

Zasady szczegółowe:

1. Stront jest wydalany głównie przez nerki, także z pewną ilością żółci dlatego przez kilka dni po podaniu strontu, mocz i kał są radioaktywne. Toaleta powinna być w tym czasie po każdym oddaniu stolca lub moczu podwójnie spłukiwana. Pozostawiona kropla moczu powinna być wytarta papierem toaletowym, który następnie spłukujemy.
2. Personel sprząający w ubikacjach musi stosować środki ochronne. Istotne jest dokładne umycie rąk po zakończeniu sprząania.
3. Zabrudzona strontem odzież powinna być prana natychmiast i oddzielnie w stosunku do innych ubrań.
4. Oczekiwany czas ustępowania bólu wynosi 10-20 dni po podaniu dożylniej dawki strontu.
5. Powtórne leczenie strontem można powtórzyć po upływie co najmniej 3 miesięcy.
6. Leczenia nie należy stosować przy zbyt niskich parametrach hematologicznych krwi.
7. Po podaniu zastrzyku strontu należy kontynuować dotychczas stosowane leczenie onkologiczne i przeciwbólowe, niekiedy należy nawet zwiększyć dawki leków przeciwbólowych.
8. Po zastosowanym leczeniu chory podlega kontroli u lekarza leczącego i w zakładzie medycyny nuklearnej przez okres 1 roku.

Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ
lek. med. Witold Zasieczny